DOI: 10.29326/2304-196X-2021-3-38-216-223
УДК 619:616.98:578.842.1:611.018.54:616-078

Влияние условий хранения сывороток крови свиней на выявление антител к вирусу АЧС методом ИФА

А. Р. Шотин¹, И. Ю. Жуков², А. С. Першин³, Али Мазлум⁴, И. В. Шевченко⁵, А. С. Иголкин⁶, О. А. Мануйлова⁷, К. Н. Груздев⁸

ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), г. Владимир, Россия

¹ ORCID 0000-0001-9884-1841, e-mail: shotin@arriah.ru

² ORCID 0000-0002-3817-2129, e-mail: zhukov@arriah.ru

³ ORCID 0000-0002-5099-3050, e-mail: daredron@gmail.com

⁴ ORCID 0000-0002-5982-8393, e-mail: mazlum@arriah.ru

⁵ ORCID 0000-0001-6482-7814, e-mail: shevchenko@arriah.ru

⁶ ORCID 0000-0002-5438-8026, e-mail: igolkin_as@arriah.ru

⁷ ORCID 0000-0002-4616-5316, e-mail: o.manuylova@list.ru

⁸ ORCID 0000-0003-3159-1969, e-mail: gruzdev@arriah.ru

РЕЗЮМЕ

Одной из мер борьбы с распространением и профилактики африканской чумы свиней в Российской Федерации является проведение исследований проб, отбираемых от свиней и кабанов, в том числе серологическими методами с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) для качественного определения содержания антител к вирусу. При этом в настоящее время на территории страны не существует нормативного документа, регламентирующего условия хранения проб сыворотки крови для постановки ИФА при определении содержания антител к вирусу АЧС. Также отсутствуют литературные данные о максимально допустимом сроке хранения проб сыворотки крови свиней, а влияние условий хранения на серологический статус сывороток крови домашних свиней в отношении АЧС изучено недостаточно. В статье представлены результаты эксперимента по определению влияния температурных режимов и длительности хранения серопозитивных и серонегативных в отношении вируса АЧС сывороток крови домашних свиней на их серологический статус при постановке тест-системой INgezim PPA Compas (Ingenasa, Испания) для твердофазного ИФА и вероятности получения ложных результатов. В ходе выполнения работы и анализа результатов получены новые данные, свидетельствующие об отсутствии или незначительном влиянии моделируемых режимов хранения на определение серологического статуса качественных проб сывороток крови в отношении вируса АЧС, в то время как гемолизированные пробы показали более заметное изменение, пропорциональное степени гемолиза и длительности хранения. Несмотря на то что полученные результаты по обнаружению антител к возбудителям одних болезней не применимы для других патогенов, данное исследование имеет существенное прикладное значение, позволяя установить зависимость получения достоверных результатов при серодиагностике АЧС от условий хранения проб.

Ключевые слова: африканская чума свиней, иммуноферментный анализ, сыворотка крови, условия хранения

Благодарность: Исследование выполнено за счет средств федерального бюджета в рамках проведения научно-исследовательских работ по теме: «Проведение прикладных научных исследований» (ГЗ № 081-00010-19-00 от 28.12.2018).

Для цитирования: Шотин А. Р., Жуков И. Ю., Першин А. С., Мазлум Али, Шевченко И. В., Иголкин А. С., Мануйлова О. А., Груздев К. Н. Влияние условий хранения сывороток крови свиней на выявление антител к вирусу АЧС методом ИФА. *Ветеринария сегодня*. 2021; 10 (3): 216–223. DOI: 10.29326/2304-196X-2021-3-38-216-223.

Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для корреспонденции: Шотин Андрей Романович, аспирант, ведущий биолог референтной лаборатории по африканской чуме свиней ФГБУ «ВНИИЗЖ», 600901, Россия, г. Владимир, мкр. Юрьевец, e-mail: shotin@arriah.ru.

Effect of pig serum storage conditions on detection of anti-ASFV antibodies by ELISA

A. R. Shotin¹, I. Yu. Zhukov², A. S. Pershin³, Ali Mazloun⁴, I. V. Shevchenko⁵, A. S. Igolkin⁶, O. A. Manuylova⁷, K. N. Gruzdev⁸

FGBI "Federal Centre for Animal Health" (FGBI "ARRIAH"), Vladimir, Russia

¹ ORCID 0000-0001-9884-1841, e-mail: shotin@arriah.ru

² ORCID 0000-0002-3817-2129, e-mail: zhukov@arriah.ru

³ ORCID 0000-0002-5099-3050, e-mail: daredron@gmail.com

⁴ ORCID 0000-0002-5982-8393, e-mail: mazlum@arriah.ru

⁵ ORCID 0000-0001-6482-7814, e-mail: shevchenko@arriah.ru

⁶ ORCID 0000-0002-5438-8026, e-mail: igolkin_as@arriah.ru

⁷ ORCID 0000-0002-4616-5316, e-mail: O.manuylova@list.ru

⁸ ORCID 0000-0003-3159-1969, e-mail: gruzdev@arriah.ru

SUMMARY

One of the measures used to control and prevent African swine fever spread in the Russian Federation involves testing pig and boar sera using *inter alia* serological tools based on enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for anti-viral antibody detection. However, there is no unified regulatory document specifying storage conditions for sera used in the ELISA for anti-ASFV antibody detection. There are also lack of published data on the maximum admissible shelf life of the pig sera, and the effect of storage conditions on the serological status of the pig sera as for ASF is understudied. The paper demonstrates results of the experiment aimed at the determination of the effect of storage temperatures and shelf life on the serological status of ASFV seropositive and seronegative pig sera when tested by INgezim PPA Compac (Ingenasa, Spain) ELISA as well as on the possibility of false results. During the experiment and analysis of its results, the new data were obtained, and they indicated from none to non-significant effect of the simulated storage conditions on the serological status of sera used for ASFV detection, while hemolyzed sera demonstrated more significant changes proportional to hemolysis degree and storage duration. Although the results of detection of antibodies against the agents of some diseases cannot be used in case of other pathogens, this study has a substantial applied significance as it allows to specify the dependence of the valid results of ASF serodiagnosis on the storage conditions of the samples.

Keywords: African swine fever, enzyme-linked immunosorbent assay, serum, storage conditions

Acknowledgements: The experiment was funded by the federal government as a part of the research activities "Applied Research" (SA No. 081-00010-19-00 от 28.12.2018).

For citation: Shotin A. R., Zhukov I. Yu., Pershin A. S., Mazloun Ali, Shevchenko I. V., Igolkin A. S., Manuylova O. A., Gruzdev K. N. Effect of pig serum storage conditions on detection of anti-ASFV antibodies by ELISA. *Veterinary Science Today*. 2021; 10 (3): 216–223. DOI: 10.29326/2304-196X-2021-3-38-216-223.

Conflict of interest: The authors declare no conflict of interest.

For correspondence: Andrey R. Shotin, Post-Graduate Student, Leading Biologist, Reference Laboratory for African Swine Fever, FGBI "ARRIAH", 600901, Russia, Vladimir, Yur'evets, e-mail: shotin@arriah.ru.

ВВЕДЕНИЕ

Африканская чума свиней (АЧС) является контагиозным вирусным заболеванием домашних свиней и кабанов, проявляющимся у восприимчивых животных в виде геморрагической лихорадки с летальностью до 100% [1]. Резервуарами вируса являются бородавочники, кустарниковые и дикие свиньи, клещи рода *Ornithodoros*. Болезнь катастрофически воздействует на свиноводство в целом, включая предприятия всех форм собственности (от личного подсобного хозяйства до промышленной свинофермы), приводя к тяжелым социально-экономическим последствиям и угрожая продовольственной безопасности неблагополучной территории [2, 3].

Африканскую чуму свиней впервые описал Р. Монгомери в 1921 г. в Кении. Впоследствии о вспышках АЧС сообщалось из большинства стран Южной и Восточной Африки. В 1957 г. заболевание свиней, вызванное возбудителем АЧС, впервые зарегистрировали в Европе. К середине 2020 г. вирус АЧС выявляли на Африканском, Европейском и Азиатском континентах, Малайском архипелаге и в странах Океании [4].

До настоящего времени в мире не разработаны коммерчески доступные средства специфической профилактики АЧС. В связи с этим единственным способом борьбы с заболеванием является проведение комплекса профилактических мероприятий, ранняя диагностика с использованием современных и высокоточных методов, проведение убоя инфицированных и находящихся в зоне риска животных с введением строгих ограничительных мероприятий (карантина) [5, 6].

Одной из мер борьбы с распространением и профилактики АЧС в Российской Федерации является проведение мониторинговых исследований [7] и исследований в области карантина (перед отправкой и/или вводом новых животных из/в хозяйства) исследований, в том числе серологическими методами с использованием иммуноферментного анализа (ИФА) для качественного определения содержания антител к вирусу в сыворотках крови свиней [8, 9]. На сегодняшний день существует множество коммерческих наборов для проведения ИФА. Один из используемых в референтной лаборатории по АЧС ФГБУ «ВНИИЗЖ» наборов – INgezim PPA Compac (Ingenasa, Испания), который, по оценкам разных авторов, имеет специфичность от 98 до 100%.

По мнению Н. С. Bergeron et al., ложноположительные результаты могут быть связаны с низким качеством пробы [10]. Согласно инструкции к набору INgezim PPA Compac и рекомендациям Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), использование гемолизированных или контаминированных проб может привести к получению ложноположительных результатов в ИФА. Как указано в Руководстве Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), сыворотки крови должны быть исследованы немедленно после взятия или помещены на хранение при температуре ниже минус 20 °С до проведения исследования, так как точный диагноз можно поставить только тогда, когда образцы находятся в удовлетворительном состоянии [11].

Однако, согласно результатам L. Mur et al. [12], при исследовании с использованием набора INgezim PPA Compas 158 сывороток крови, в числе которых 49 были умеренно и 28 – обильно гемолизированы, 11 дали ложноположительный результат и 6 – сомнительный. При этом не было выявлено зависимости между гемолизом и ложноположительными результатами.

Из общих рекомендаций известно о том, что сыворотка крови должна быть доставлена без замораживания в диагностическую лабораторию в течение первых суток и в исключительных случаях – не позднее третьего дня после взятия крови [11, 13, 14].

Действующие ветеринарно-санитарные правила Республики Беларусь, регламентирующие порядок отбора сыворотки и плазмы крови, допускают заморозку проб и их транспортирование в таком виде. При отсутствии возможности заморозки пробы сыворотки и плазмы допускается хранить и транспортировать при температуре от 2 до 6 °C в течение не более 48 ч после отбора образца крови [15].

Для серологического исследования в лабораторию допускается направлять и цельную кровь, не отделяя сыворотку, при условии (трудно осуществимом), что в пути ее не будут встряхивать и она не подвергнется гемолизу [16].

В лаборатории сыворотки (без сгустка) до исследования хранят в холодильниках при температуре (5 ± 3) °C в течение не более 7 сут. При более длительном хранении сыворотка должна быть заморожена при минус 20 °C или ниже. Повторное замораживание размороженной сыворотки не допускается [14].

Необходимо отметить, что в настоящее время на территории РФ не существует нормативного документа, регламентирующего условия хранения проб сыворотки крови для постановки ИФА при определении содержания антител к вирусу АЧС. Таковые представлены, в частности, для бруцеллеза, где сыворотки, консервированные фенолом или борной кислотой, пригодны для исследования в течение 30 сут, замороженные – в течение 3 сут после однократного оттаивания. Мутные, проросшие, гемолизированные сыворотки крови к исследованию на бруцеллез не пригодны [17].

На сегодняшний день представлены лишь условия хранения проб органов и крови, которые хранят и транспортируют в термосе при температуре от 4 до 8 °C не более 24 ч после отбора. При более длительном хранении пробы замораживают [13].

Отсутствуют литературные данные о максимально допустимом сроке хранения проб сыворотки крови свиней, в течение которого их серологический статус в ИФА остается неизменным у 95% образцов. Данный показатель был установлен для образцов, содержащих антитела против некоторых других вирусов, например, против возбудителя гепатита D стабильность анализа в сыворотке при температуре от 4 до 8 °C составляет 4 недели, от 20 до 25 °C – 5–7 дней [18].

Влияние условий хранения на серологический статус сывороток крови домашних свиней в отношении АЧС недостаточно изучено. На данный момент опубликованы работы по изучению влияния температурных режимов (50 °C, 4 °C, минус 10 °C, цикл заморозка – оттаивание), времени хранения и степени гемолиза на определение антител против *Erysipelothrix rhusiopathiae* у свиней и *Suid herpesvirus 1* у дикого кабана в гемоли-

зированных и не подвергнутых гемолизу сыворотках крови [19, 20]. Авторами работы сделан вывод о незначительном влиянии режимов хранения на определение статуса качественных образцов сывороток крови, в то время как гемолизированные пробы показали более заметное изменение, пропорциональное степени гемолиза и длительности хранения. Следует отметить, что полученные результаты по обнаружению антител к возбудителям одних болезней не применимы для других патогенов.

Целью работы являлось определение влияния температурных режимов и длительности хранения серопозитивных и серонегативных в отношении вируса АЧС сывороток крови домашних свиней на их серологический статус при постановке твердофазного ИФА (ТФ ИФА) с использованием тест-системы INgezim PPA Compas (Ingenasa, Испания) и вероятности получения ложных результатов.

Данное исследование имеет существенное прикладное значение, позволяя установить зависимость получения достоверных результатов при серодиагностике АЧС от условий хранения проб.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Оборудование. Режимы хранения 4 °C, минус 20 °C и многократный цикл заморозки – оттаивания воспроизводили с помощью лабораторного холодильника ХЛ-340 (POZIS, Россия). Инкубацию сывороток крови при постановке ИФА проводили в термощейкере PST-60HL-4 (BioSan, Латвия). Результаты учитывали с использованием спектрофотометра Multiskan FC (Thermo Fisher Scientific, Финляндия).

Образцы. В опыте использовали 10 серопозитивных сывороток крови, полученных на 25–26-е сут после экспериментального заражения свиней штаммом «ВНИИЗЖ/АЧС-VERO (40)», и 10 серонегативных сывороток, полученных из крови клинически здоровых домашних свиней (свиноводческий комплекс, Московская обл.). Образцы не имели признаков гемолиза и были получены в соответствии с «Правилами взятия патологического материала, крови, кормов и пересылки их для лабораторного исследования» [16].

Тест-система. Образцы сывороток крови исследовали с использованием тест-системы INgezim PPA Compas (Ingenasa, Испания) для твердофазного ИФА (ТФ ИФА) и тестировались в двух повторностях. Согласно инструкции к набору, статус исследуемых сывороток выражали через коэффициент ингибиции, вычисляемый по формуле:

$$x\% = \frac{NC - \text{SAMPLE OD}}{NC - PC} \times 100,$$

где NC – значение оптических единиц (о. е.) отрицательного контроля;

PC – значение оптических единиц (о. е.) положительного контроля;

SAMPLE OD – значение оптических единиц (о. е.) испытуемой сыворотки.

Интерпретация результата:

- при $x \leq 40\%$ результат считается отрицательным (т. е. в образце не выявлены специфические антитела);
- при $x \geq 50\%$ результат считается положительным (т. е. в образце обнаружены специфические антитела);
- при $40\% > x > 50\%$ результат трактуется как сомнительный.

Таблица
Результаты тестирования сывороток крови методом ТФ ИФА

Table
Serum testing using blocking ELISA

Условие хранения	Статус сыворотки	Номер сыворотки	Среднее значение коэффициента ингибиции (%), (n = 2)					Результат
			0-й день	5-й день	15-й день	29-й день	53-й день	
Цикл заморозка – оттаивание	Серонегативные	1	17,0	26,4	23,7	22,7	28,9	–
		2	16,3	25,1	25,2	20,3	35,4	–
		3	23,2	20,8	18,2	21,2	22,3	–
		4	21,6	23,5	21,4	22,8	26,1	–
		5	22,7	26,1	23,3	22,9	27,3	–
		6	25,5	24,0	28,0	24,1	31,6	–
		7	20,3	22,3	21,1	20,1	19,1	–
		8	20,5	22,8	23,8	19,7	22,6	–
		9	17,3	20,6	18,1	16,1	20,5	–
		10	23,3	23,5	26,5	21,2	32,0	–
	Серопозитивные	11	94,1	88,1	90,5	92,0	90,6	+
		12	100,6	96,4	98,0	97,3	96,0	+
		13	97,1	91,1	92,8	92,7	91,4	+
		14	98,3	90,6	91,0	91,8	90,2	+
		15	88,1	93,7	95,0	94,9	92,3	+
		16	98,3	93,8	93,9	95,0	91,8	+
		17	86,7	85,4	83,8	87,2	85,5	+
		18	97,0	94,5	94,7	96,8	93,5	+
		19	94,8	91,6	94,7	93,5	89,9	+
		20	99,8	98,6	99,1	99,3	95,5	+
при минус 20 °С	Серонегативные	1	17,0	20,8	19,9	18,8	25,4	–
		2	16,3	20,3	21,3	22,7	26,0	–
		3	23,2	24,0	22,2	24,2	29,4	–
		4	21,6	20,9	23,2	20,3	33,8	–
		5	22,7	16,5	20,0	19,8	7,1	–
		6	25,5	19,5	20,0	21,8	24,4	–
		7	20,3	21,1	22,2	23,4	28,7	–
		8	20,5	20,0	24,4	22,9	35,4	–
		9	17,3	10,2	11,4	15,8	15,9	–
		10	23,3	20,0	25,4	20,1	28,7	–
	Серопозитивные	11	94,1	89,2	90,9	91,8	89,2	+
		12	100,6	96,2	96,2	97,6	94,9	+
		13	97,1	89,9	91,2	91,7	89,7	+
		14	98,3	89,8	90,5	92,6	90,9	+
		15	88,1	93,3	94,2	95,3	92,6	+
		16	98,3	94,3	95,3	95,8	93,2	+
		17	86,7	82,9	80,5	83,0	81,9	+
		18	97,0	91,2	90,5	92,8	91,3	+
		19	94,8	91,6	93,8	94,9	93,1	+
		20	99,8	98,2	97,4	98,4	95,3	+
при 4 °С	Серонегативные	1	17,0	19,8	20,1	10,5	26,6	–
		2	16,3	19,9	19,1	11,2	29,8	–
		3	23,2	12,3	21,2	15,8	16,5	–
		4	21,6	19,3	22,3	13,0	23,5	–
		5	22,7	20,2	20,8	11,2	27,4	–
		6	25,5	16,5	19,7	13,4	26,9	–
		7	20,3	19,6	20,4	15,7	16,2	–
		8	20,5	20,5	20,1	14,1	26,1	–
		9	17,3	17,0	11,1	4,3	23,6	–
		10	23,3	17,0	21,5	13,5	25,9	–
	Серопозитивные	11	94,1	87,3	89,0	89,3	87,2	+
		12	100,6	93,3	95,9	96,8	94,3	+
		13	97,1	93,5	93,4	90,3	92,0	+
		14	98,3	90,2	90,2	88,6	88,1	+
		15	88,1	93,7	95,0	95,6	92,4	+
		16	98,3	92,5	95,3	93,8	91,3	+
		17	86,7	84,2	81,7	80,3	83,7	+
		18	97,0	93,1	93,4	94,4	92,8	+
		19	94,8	93,1	93,0	94,9	90,8	+
		20	99,8	96,2	96,8	97,9	93,5	+
при 20 °С	Серонегативные	1	17,0	13,1	17,0	19,8	11,2	–
		2	16,3	18,8	20,9	20,6	13,0	–
		3	23,2	19,3	14,0	17,0	19,1	–
		4	21,6	18,6	19,9	22,1	20,8	–
		5	22,7	16,6	22,0	21,9	10,2	–
		6	25,5	19,4	18,1	16,6	15,4	–
		7	20,3	18,7	20,9	17,7	18,9	–
		8	20,5	18,9	20,3	21,1	19,2	–
		9	17,3	10,2	17,2	17,3	6,3	–
		10	23,3	17,3	22,0	18,0	18,8	–
	Серопозитивные	11	94,1	89,1	89,1	90,5	87,5	+
		12	100,6	97,9	97,7	98,7	92,6	+
		13	97,1	91,3	91,2	94,6	88,1	+
		14	98,3	88,3	88,4	90,9	85,9	+
		15	88,1	95,4	95,2	95,5	92,4	+
		16	98,3	95,2	95,5	95,8	92,3	+
		17	86,7	81,0	83,4	85,5	79,2	+
		18	97,0	92,3	95,3	95,7	90,8	+
		19	94,8	92,6	93,5	93,7	91,7	+
		20	99,8	96,9	97,8	98,7	94,0	+

«+» – результат положительный (positive result); «–» – результат отрицательный (negative result).

Экспериментальные сыворотки крови хранили при следующих температурных режимах:

1. Хранение при минус 20 °С;
2. Хранение при 4 °С;
3. Хранение при комнатной температуре (от 20 до 25 °С);
4. Многократный цикл заморозки – оттаивания (ежедневная заморозка при минус 20 °С в течение 23 ч с последующим оттаиванием при комнатной температуре в течение часа).

Анализ осуществляли в день начала эксперимента (нулевой день), на 5, 15, 29 и 53-й дни после начала опыта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Первое тестирование, для подтверждения серологического статуса экспериментальных сывороток крови, провели в день начала эксперимента.

Экспериментальные образцы разделили на 4 части и хранили при различных температурных режимах в течение 53 дней. Каждую группу опытных сывороток крови анализировали согласно плану опыта. Результаты представлены в таблице.

Полученные данные демонстрируют, что при изменении коэффициента ингибции в течение эксперимента статус сывороток в ТФ ИФА оставался неизменным.

Следуя обобщенным рекомендациям по хранению проб сывороток крови для лабораторной диагности-

ки [11, 14, 15], эталонными значениями считали результаты, полученные при исследовании сывороток, хранящихся в замороженном виде. Вариация значений зависела от технических условий реализации метода (температура, влажность, длительность хранения набора и т. д.).

Динамика изменения коэффициентов ингибции серонегативных и серопозитивных образцов отражена на рисунке 1. Из представленных на нем данных, касающихся отрицательных сывороток крови, видно, что:

- среднее значение коэффициента ингибции в начале эксперимента составило 20,8%;
- для сывороток, хранящихся при минус 20 °С, среднее значение коэффициента ингибции составляло 21,5%, минимальное – 7,1% (53-й день), максимальное – 35,4% (53-й день);
- для сывороток, подвергнутых циклу заморозки – оттаивания, среднее значение коэффициента ингибции составляло 22,8%, минимальное – 16,1% (29-й день), максимальное – 35,4% (53-й день);
- для сывороток, хранящихся при 4 °С, среднее значение коэффициента ингибции составляло 19%, минимальное – 4,3% (29-й день), максимальное – 29,8% (53-й день);
- для сывороток, хранящихся при 20 °С, среднее значение составляло 18,3%, минимальное – 6,3% (53-й день), максимальное – 25,5% (нулевой день).

Рис. 1. Динамика изменения коэффициентов ингибции серонегативных и серопозитивных образцов. Линиями при коэффициентах ингибции 40 и 50% отмечены границы отрицательного и положительного результатов

Fig. 1. Dynamics of inhibition coefficients for seronegative and seropositive samples. Lines in case of 40% and 50% inhibition are the negative/positive cut-off

Изменение разницы коэффициентов ингибции относительно эталонных образцов для отрицательных сывороток крови представлено на рисунке 2.

Установлено, что на протяжении всего исследования коэффициент ингибции серонегативных сывороток крови, подвергнутых циклу заморозки – оттаивания был выше эталонных значений, но не превышал 4,2%, а в среднем отличался на 1,7%; данный показатель сывороток, хранившихся при 4 °С, был ниже эталонных значений, но не превышал 8,7%, а в среднем отличался на 3,1%; коэффициент ингибции сывороток, хранившихся при 20 °С, был ниже эталонных значений, но не превышал 10,2%, а в среднем отличался на 4%.

Исходя из данных, полученных при исследовании серопозитивных сывороток крови свиней (рис. 1), видно, что:

- начальное значение коэффициента ингибции составляло в среднем 95,5%;

- для сывороток, хранящихся при минус 20 °С, среднее значение данного показателя составляло 92,8%, минимальное – 80,5% (15-й день), максимальное – 100,6% (нулевой день);

- для сывороток, подвергнутых циклу заморозки – оттаивания, среднее значение коэффициента ингибции составляло 93,4%, минимальное – 83,8% (15-й день), максимальное – 100,6% (нулевой день);

- для сывороток, хранящихся при 4 °С, среднее значение коэффициента ингибции составляло 92,5%, минимальное – 80,3% (29-й день), максимальное – 100,6% (нулевой день);

- для сывороток, хранящихся при 20 °С среднее значение коэффициента ингибции составляло 92,7%, минимальное – 79,2% (53-й день), максимальное – 100,6% (нулевой день).

Разница коэффициентов ингибции положительных образцов относительно сывороток крови, хранящихся при минус 20 °С, отражена на рисунке 3.

Как видим, коэффициент ингибции серопозитивных сывороток крови, подвергнутых циклу заморозки – оттаивания, на протяжении всего периода исследования был выше эталонных значений, но не превышал 1,3%, а в среднем отличался на 0,8%.

Коэффициент ингибции сывороток крови, хранившихся при 4 °С, в течение 15 дней был выше эталонного значения (максимально – на 0,3%), затем ниже его (максимально – на 1,2%), а в среднем отличался на 0,4%.

Коэффициент ингибции сывороток крови, хранившихся при 20 °С, до 29-го дня был выше значения эталонных образцов (максимально – на 0,7%), а затем ниже на 1,8%, а в среднем отличался на 0,1%.

В группе серопозитивных сывороток крови, хранящихся при 4 °С, коэффициент ингибции для отдельных образцов в течение исследования варьировал в пределах от 4,3 до 23,6%. Однако статус образцов на протяжении всего эксперимента не менялся.

ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе проведенного моделирования различных режимов хранения экспериментальных сывороток крови свиней, положительных и отрицательных по наличию антител к вирусу АЧС, были получены данные об отсутствии изменения их серологического статуса с течением времени.

Исследуемые образцы сывороток хранились при различных температурных режимах (минус 20 °С, 4 °С,

Режим / день	0	5	15	29	53
минус 20 °С	0	0	0	0	0
заморозка/оттаивание	0	4,2	1,9	0,1	0,5
4 °С	0	-1,1	-1,4	-8,7	-1,2
20 °С	0	-2,2	-1,8	-1,8	-10,2

Рис. 2. Изменение коэффициентов ингибции серонегативных сывороток крови относительно значений эталонных образцов (хранение при минус 20 °С)

Fig. 2. Changes of inhibition coefficients of seronegative sera as compared to reference sera (storage at minus 20 °С)

Режим / день	0	5	15	29	53
минус 20 °С	0	0	0	0	0
заморозка/оттаивание	0	0,7	1,3	0,7	0,5
4 °С	0	0	0,3	-1,2	-0,6
20 °С	0	0,3	0,7	0,6	-1,8

Рис. 3. Изменение коэффициентов ингибции серопозитивных сывороток крови относительно эталонных образцов (хранение при минус 20 °С)

Fig. 3. Changes of inhibition coefficients of seropositive sera as compared to reference sera (storage at minus 20 °С)

20 °С, цикл заморозки – оттаивания) в течение 53 дней. Несмотря на варьирование показателей коэффициентов ингибции отрицательных и положительных образцов на протяжении исследуемого периода по отношению к эталонным значениям, в ТФ ИФА получали качественный результат, что говорит об отсутствии или незначительном влиянии использованных условий хранения на результаты исследования.

Полученные данные согласуются с результатами других авторов, проводивших аналогичные исследования по выявлению антител к другим возбудителям инфекций. В работе E. J. Neumann and K. N. Bonistalli сывороточные антитела оказались значительно более устойчивыми, чем считалось ранее, а значения оптической плотности были стабильны даже в условиях грубого нарушения температурного режима хранения [19, 20].

Однако методология, примененная в данном исследовании, имеет некоторые ограничения. В работе использовалась тест-система только одного производителя, титр антител в сыворотках не определялся, а также не тестировались слабоположительные пробы.

Следовательно, для определения причины получения ложных результатов необходимо проведение дальнейших исследований и изучение сохранности образцов сывороток крови для исследования на АЧС, учитывая, что биологические образцы, получаемые от животных, не однородны по своему составу, особенно в случае присутствия патогенной микрофлоры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенных исследований установлено, что при хранении проб сывороток крови свиней в смоделированных температурных режимах статус исследуемых на АЧС позитивных с высоким изначальным коэффициентом ингибции и негативных сывороток крови при постановке ТФ ИФА с использованием тест-системы INgezim PPA Compac (Ingenasa, Испания) не изменялся на протяжении 53 дней.

Сыворотки крови домашних свиней, отобранные в соответствии с действующими правилами, возможно хранить в вышеперечисленных условиях до 53 дней (срок наблюдения) при условии их последующего исследования соответствующим набором. Это позволит упростить их транспортировку в течение длительного времени при невозможности заморозки. Также, в случае необходимости проведения дополнительных исследований, появляется возможность многократного исследования одного и того же образца в течение длительного хранения.

Однако, пока не изучено влияние условий хранения на статус сывороток крови при исследовании на АЧС с помощью других наборов и методов (иммуноблоттинга, иммунопероксидазного, иммунохроматографического анализа, иммуноферментного анализа с использованием комплексного антигена и др.), общая рекомендация остается прежней – доставлять в лабораторию образцы для исследований в максимально короткие сроки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ (п. п. 2, 4, 5, 8, 10, 12, 19, 20 см. REFERENCES)

- Ремыга С. Г., Першин А. С., Шевченко И. В., Иголкин А. С., Шевцов А. А. Клинические и патологоанатомические изменения у диких европейских кабанов и домашних свиней при заражении вирусом африканской чумы свиней. *Ветеринария сегодня*. 2016; 3 (18): 46–51. Режим доступа: <https://veterinary.arriah.ru/jour/article/view/260>.
- Пособие по подготовке чрезвычайных планов действий на случай эпидемии африканской чумы свиней. Под ред. М.-Л. Пенрит, В. Губерти, К. Деннер, Х. Луборт. *Руководство ФАО по здравоохранению и воспроизводству животных*. № 8. Рим: ФАО; 2011. 78 с. Режим доступа: <http://www.fao.org/3/i1196r/i1196r.pdf>.
- Груздев К. Н., Караулов А. К., Иголкин А. С. Опыт борьбы с африканской чумой свиней в Российской Федерации и его значение для других стран. *Ветеринария сегодня*. 2020; 1 (32): 38–43. DOI: 10.29326/2304-196X-2020-1-32-38-43.

- Шевцов А. А., Петрова О. Н., Ремыга С. Г., Першин А. С., Груздев К. Н., Иголкин А. С. Анализ проведения лабораторных исследований по ряду вирусных болезней свиней на территории России в 2011–2017 гг. *Ветеринария сегодня*. 2018; 1 (24): 42–48. DOI: 10.29326/2304-196X-2018-1-24-42-48.
- Першин А. С., Шевченко И. В., Иголкин А. С., Жуков И. Ю., Власова Н. Н., Мануйлова О. А. Динамика антителообразования при экспериментальном заражении вирусом африканской чумы свиней. *Ветеринария Кубани*. 2019; 4: 3–7. DOI: 10.33861/2071-8020-2019-4-3-7.

- Бельтран Алькрудо Д., Ариас М., Гайардо К., Крамер С., Пенрит М. Л. Африканская чума свиней: обнаружение и диагностика. *Руководство для ветеринаров. Руководство ФАО по здравоохранению и воспроизводству животных*. № 19. Рим: ФАО; 2017. 93 с. Режим доступа: <http://www.fao.org/3/i7228r/i7228r.pdf>.
- ГОСТ 28573-90 Свиньи. Методы лабораторной диагностики африканской чумы. М.: Стандартинформ; 2005. 9 с. Режим доступа: <https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294826/4294826183.pdf>.
- Изучение популяционного иммунитета к гриппу у населения Российской Федерации: методические указания (МУ 3.1.3490-17). М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 2018. 34 с. Режим доступа: <https://www.meganorm.ru/Data2/1/4293738/4293738228.pdf>.

- Ветеринарно-санитарные правила отбора проб для контроля содержания вредных веществ и их остатков в живых животных и продуктах животного происхождения: Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 23.09.2010 № 57. Режим доступа: <https://mshp.gov.by/print/documents/technical-acts/e13f0df74187a8fa.html>.
- Правила взятия патологического материала, крови, кормов и пересылки их для лабораторного исследования: утв. Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 24.06.1971. Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/1200109238>.
- ГОСТ 34105-2017 Животные. Лабораторная диагностика бруцеллеза. Серологические методы. М.: Стандартинформ; 2017. 23 с. Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/1200145963>.
- ГОСТ Р 53079.4-2008 Технологии лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 4. Правила ведения преаналитического этапа. М.: Стандартинформ; 2009. 65 с. Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/1200072566>.

REFERENCES

- Remyga S. G., Pershin A. S., Shevchenko I. V., Igolkin A. S., Shevtsov A. A. Clinical and post-mortem signs in European wild boars and domestic pigs infected with African swine fever virus. *Veterinary Science Today*. 2016; 3 (18): 46–51. Available at: <https://veterinary.arriah.ru/jour/article/view/260>. (in Russian)
- Alonso C., Borca M., Dixon L., Revilla Y., Rodriguez F., Escibano J. M., ICTV Report Consortium. ICTV Virus Taxonomy Profile: *Asfarviridae*. *J. Gen. Virol.* 2018; 99 (5): 613–614. DOI: 10.1099/jgv.0.001049.
- Preparation of African swine fever contingency plans. Ed. by M.-L. Penrith, V. Guberti, K. Depner, J. Lubroth. *FAO Animal Production and Health Manual*. No. 8. Rome: FAO; 2009. 70 p. Available at: <http://www.fao.org/3/i1196e/i1196e.pdf>.
- World Animal Health Information and Analysis Department. African swine fever (ASF). Report No. 12: March 01 – March 14, 2019. Available at: http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/Pdf/Disease_cards/ASF/Report_12_Current_situation_ASF.pdf.
- Galindo I., Alonso C. African swine fever virus: A review. *Viruses*. 2017; 9 (5): 103. DOI: 10.3390/v9050103.
- Gruzdev K. N., Karaulov A. K., Igolkin A. S. Experience in African swine fever control in the Russian Federation and its value for the other countries. *Veterinary Science Today*. 2020; 1 (32): 38–43. DOI: 10.29326/2304-196X-2020-1-32-38-43.
- Shevtsov A. A., Petrova O. N., Remyga S. G., Pershin A. S., Gruzdev K. N., Igolkin A. S. Analysis of laboratory tests for several viral swine diseases in Russia in 2011–2017. *Veterinary Science Today*. 2018; 1 (24): 42–48. DOI: 10.29326/2304-196X-2018-1-24-42-48.
- Pershin A., Shevchenko I., Igolkin A., Zhukov I., Mazloum A., Aro-nova E., et al. A long-term study of the biological properties of ASF virus isolates originating from various regions of the Russian Federation in 2013–2018. *Vet. Sci.* 2019; 6 (4): 99. DOI: 10.3390/vetsci6040099.
- Pershin A. S., Shevchenko I. V., Igolkin A. S., Zhukov I. Yu., Vlasova N. N., Manuylova O. A. Dynamics of ofantibodies production after experimental challenge with ASF virus. *Veterinaria Kubani*. 2019; 4: 3–7. DOI: 10.33861/2071-8020-2019-4-3-7. (in Russian)
- Bergeron H. C., Glas P. S., Schumann K. R. Diagnostic specificity of the African swine fever virus antibody detection enzyme-linked immunosorbent assay in feral and domestic pigs in the United States. *Transbound. Emerg. Dis.* 2017; 64 (6): 1665–1668. DOI: 10.1111/tbed.12717.

11. Beltrán-Alcrudo D., Arias M., Gallardo C., Kramer S., Penrith M. L. 2017. African swine fever: detection and diagnosis – A manual for veterinarians. *FAO Animal Production and Health Manual*. No. 19. Rome: FAO; 2017. 88 p. Available at: <http://www.fao.org/3/i7228e/i7228e.pdf>.

12. Mur L., Boadella M., Martínez-López B., Gallardo C., Gortazar C., Sánchez-Vizcaíno J. M. Monitoring of African swine fever in the wild boar population of the most recent endemic area of Spain. *Transbound. Emerg. Dis.* 2012; 59 (6): 526–531. DOI: 10.1111/j.1865-1682.2012.01308.x.

13. GOST 28573-90 Pigs. Methods of laboratory diagnostics of african plague. M.: Standartinform; 2005. 9 p. Available at: <https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294826/4294826183.pdf>. (in Russian)

14. Examination of the population immunity against influenza in people in the Russian Federation [Izuchenie populyacionnogo immuniteta k grippu u naseleniya Rossijskoj Federacii]: Methodical Guidelines (MG 3.1.3490-17). M.: Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing; 2018. 34 p. Available at: <https://www.meganorm.ru/Data2/1/4293738/4293738228.pdf>. (in Russian)

15. Rules of veterinary and sanitary sampling for the control of harmful substances and their residues in live animals and products of animal origin [Veterinarno-sanitarnye pravila otbora prob dlya kontrolya soderzhaniya vrednyh veshchestv i ih ostatkov v zhivyh zhivotnyh i produktah zhivotnogo proiskhozhdeniya]: Regulation of the Ministry of Agriculture of the Republic of Belarus as of 23.09.2010 No. 57. Available at: <https://mshp.gov.by/print/documents/technical-acts/e13f0df74187a8fa.html>. (in Russian)

16. Rules of sampling pathological materials, blood, feed and their delivery for laboratory testing [Pravila vzyatiya patologicheskogo materiala, krovi, kormov i peresylki ih dlya laboratornogo issledovaniya]: approved by the Main Veterinary Department of the USSR Ministry of Agriculture on 24.06.1971. Available at: <https://docs.cntd.ru/document/1200109238>. (in Russian)

17. GOST 34105-2017 Animals. Laboratory diagnostics of brucellosis. Serological methods. M.: Standartinform; 2017. 23 p. Available at: <http://docs.cntd.ru/document/1200145963>. (in Russian)

18. GOST R 53079.4-2008 Clinical laboratory technologies. Quality assurance of clinical laboratory tests. Part 4. Rules for conducting of preanalytical stage. M.: Standartinform; 2009. 65 p. Available at: <http://docs.cntd.ru/document/1200072566>. (in Russian)

19. Boadella M., Gortázar C. Effect of haemolysis and repeated freeze-thawing cycles on wild boar serum antibody testing by ELISA. *BMC Res. Notes*. 2011; 4:498. DOI: 10.1186/1756-0500-4-498.

20. Neumann E. J., Bonistalli K. N. Effect of blood sample handling post-collection on *Erysipelothrix rhusiopathiae* antibody titres. *Vet. J.* 2009; 180 (3): 325–329. DOI: 10.1016/j.tvjl.2008.07.020.

Поступила 22.04.2021

Принята в печать 20.07.2021

Received on 22.04.2021

Approved for publication on 20.07.2021

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Шотин Андрей Романович, аспирант, ведущий биолог референтной лаборатории по африканской чуме свиней ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, Россия.

Жуков Иван Юрьевич, кандидат биологических наук, младший научный сотрудник референтной лаборатории по африканской чуме свиней ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, Россия.

Першин Андрей Сергеевич, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник референтной лаборатории по африканской чуме свиней ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, Россия.

Мазлум Али, кандидат биологических наук, научный сотрудник референтной лаборатории по африканской чуме свиней ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, Россия.

Шевченко Иван Вячеславович, кандидат биологических наук, научный сотрудник референтной лаборатории по африканской чуме свиней ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, Россия.

Иголкин Алексей Сергеевич, кандидат ветеринарных наук, заведующий референтной лабораторией по африканской чуме свиней ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, Россия.

Мануйлова Ольга Анатольевна, биолог референтной лаборатории по африканской чуме свиней ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, Россия.

Груздев Константин Николаевич, доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник информационно-аналитического центра ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, Россия.

Andrey R. Shotin, Post-Graduate Student, Leading Biologist, Reference Laboratory for African Swine Fever, FGBI "ARRIAH", Vladimir, Russia.

Ivan Yu. Zhukov, Candidate of Science (Biology), Junior Researcher, Reference Laboratory for African Swine Fever, FGBI "ARRIAH", Vladimir, Russia.

Andrey S. Pershin, Candidate of Science (Veterinary Medicine), Senior Researcher, Reference Laboratory for African Swine Fever, FGBI "ARRIAH", Vladimir, Russia.

Ali Mazloun, Candidate of Science (Biology), Researcher, Reference Laboratory for African Swine Fever, FGBI "ARRIAH", Vladimir, Russia.

Ivan V. Shevchenko, Candidate of Science (Biology), Researcher, Reference Laboratory for African Swine Fever, FGBI "ARRIAH", Vladimir, Russia.

Alexey S. Igolkin, Candidate of Science (Veterinary Medicine), Head of Reference Laboratory for African swine fever, FGBI "ARRIAH", Vladimir, Russia.

Olga A. Manuylova, Biologist, Reference Laboratory for African Swine Fever, FGBI "ARRIAH", Vladimir, Russia.

Konstantin N. Gruzdev, Doctor of Science (Biology), Professor, Chief Researcher, Information and Analysis Centre, FGBI "ARRIAH", Vladimir, Russia.